


Hyperglykämie Maßnahmen

1. **BZ** hoch

- Insulinzufuhr kontrollieren
 - Katheter, Stichstelle intakt?
 - Insulinkontrolle auf Ablaufdatum, Veränderung?
- erste Insulinkorrektur verabreichen



(BZ - BZ Ziel) : Korrekturfaktor = Korrekturinsulin

2. **BZ** Kontrolle und immer noch hoch

- Insulinset wechseln
 - neues Insulin
 - neuer Katheter / neuer Pod / neue Pen-Nadel
- Zweite Insulinkorrektur verabreichen
 - Wasser trinken
 - keine gKH essen
 - kein Sport
- Basalinsulin erhöhen (+20% oder "Boost")



3. **BZ** Kontrolle und immer noch hoch

4. **BK** Kontrolle:

- 0-0,5:** normal → Korrektur auf 100 korrigieren
- 0,6-1:** leicht erhöht → Korrektur auf 100 korrigieren
 - stündliche BK messung
- 1-3:** erhöht → Insulinzufuhr wechseln
 - Korrektur verdoppeln
 - Kontakt mit Diabetesteam
- >1,5 + Symptome** → sofort ins Krankenhaus
- >3:** sehr hoch → sofort ins Krankenhaus
 - "**Ketoazidose**" = Lebensgefahr

